

Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur - OVDAS



REGION	Los Lagos		
RAV No.	34	Fecha - Hora	22 de mayo de 2015 16:00 HL
Periodo Evaluado:	21 mayo (15:00 HL)	22 mayo (15:00 HL)	
Volcán	Calbuco	GVP ID	358020
RAV anterior	NARANJA	Alerta actual	NARANJA

1. OBSERVACIONES

1.1 Vigilancia volcánica:

1.1.1 Actividad sísmica: Durante el periodo evaluado continuó la actividad sísmica asociada al movimiento de fluidos al interior del volcán, con el registro de señal tipo tremor. Esta señal ha permanecido con valores de Desplazamiento Reducido [DR, parámetro que indica el tamaño de la señal sísmica en el origen] máximo de 0,8 cm², valor considerado bajo para este volcán. Respecto a la sismicidad de tipo Largo Periodo [LP, asociados al movimiento de fluidos] y volcano-tectónica [VT, asociados con ruptura de roca] no se registraron eventos asociados al volcán.

No. Eventos	[ML Max LP / DR Máx LP]	Tr DR máximo
-	-	0,8 cm ²

Observaciones: Los niveles de sismicidad asociados a la dinámica del volcán, continúan con la tendencia a la baja.

1.1.2 Actividad superficial

Columna Altura (km)	Dirección principal	Pluma Distancia (km)	Fuente información
Nublado	-	-	Cámara IP ULMO

Incandescencia	Nublado	Altura máxima (km)	-
----------------	---------	--------------------	---

Observaciones: Las condiciones meteorológicas adversas no permitieron observar el sector del cráter activo del volcán.

1.1.3 Otras Observaciones:

El sitio web MIROVA (<http://www.mirovaweb.it/>) no reportó alerta de anomalía termal.

2. Peligro

El volcán Calbuco corresponde a unos de los volcanes de mayor riesgo específico del país. Su etapa evolutiva más reciente (últimos 14.500 años) se inicia con un evento de colapso volcánico, el cual generó un anfiteatro de 2 km de diámetro. Los eventos eruptivos posteriores han comprendido erupciones tanto efusivas como explosivas, estas últimas eventualmente plinianas y responsables de la generación del mayor depósito de flujo piroclástico del volcán, el cual alcanza inclusive la localidad de Puerto Montt, distante a más de 30 km. Durante la prehistoria reciente se generó un gran cráter hacia la cumbre del edificio moderno, de hasta 1.5 km de diámetro, con una escotadura más baja hacia el noreste. Desde el año 1893 se comenzó a construir una secuencia de domos dentro del anfiteatro de colapso eruptivo, la cual continuó su construcción durante las erupciones de los años 1911-12, 1917, 1929 y 1961. Las erupciones históricas han sido habitualmente acompañadas por numerosos flujos piroclásticos de bloques y ceniza, además de lahares calientes y fríos que han escurrido, preferentemente, hacia los ríos Tepú, Blanco Norte, Caliente - Hueñuhueñu, Este, Colorado y Blanco Sur. Las condiciones actuales sugieren que la generación de columnas eruptivas con alturas mayores a 15 km s.n.m continúan siendo eventos probables en el corto plazo, en cuyo caso cabe la posibilidad de colapsos parciales de éstas, produciendo flujos piroclásticos de moderado alcance en torno al volcán. Idéntica relevancia adquiere la posibilidad de lahares a través de los cursos fluviales principales, los que pueden alcanzar los lagos Llanquihue y/o Chapo. La ocurrencia de eventos explosivos considerables pueden generar dispersión y acumulación de importante cantidad de material piroclástico, concentrado preferentemente hacia los cuadrantes N, NE y E.

VER MAPA DE PELIGROS ANEXO

Exposición/Riesgo específico

La zona considerada como área de peligro en las condiciones actuales, se circunscribe al sector interno que contiene las áreas afectadas en la fase más intensa de la erupción, la cual se extiende hasta por cerca de 8 km hacia el NE del volcán, principalmente a lo largo del Río Blanco-Este. Los procesos esperados corresponden a colapsos parciales de la parte alta del edificio volcánico y su posterior transformación en lahares, pero cada vez con menor probabilidad de ocurrencia. Asimismo, lahares secundarios de menor envergadura podrían afectar más allá de la zona proximal a lo largo de los cauces que drenan directamente del edificio volcánico.

3. Conclusión:

La actividad sísmica continúa con valores promedios considerados bajos, indicando un descenso paulatino en la actividad durante los últimos días. Aún así, el sistema es inestable y existe la posibilidad de evolución hacia condiciones que podrían favorecer una reactivación de la actividad eruptiva. Por otra parte, una fracción menor del material piroclástico inestable acumulado en la parte superior del volcán y en sus laderas, así como en sectores aledaños, podría ser removilizado por lluvia dando origen a lahares secundarios a lo largo de los ríos que drenan del volcán y las cuencas vecinas. Sobre la base de los antecedentes técnicos reportados, se mantiene la alerta en nivel **NARANJA**.

Reporta	OVDAS-RNVV	Recepción:
---------	------------	------------

Sernageomin - Red Nacional de Vigilancia Volcánica

Mapa de Peligros Volcánicos

Volcán Calbuco, 22 de Mayo de 2015

